




© pixabay.com

Le chardonneret élégant est un petit oiseau facilement reconnaissable par ses **couleurs vives**. Vous pourrez l'identifier grâce à sa **face rouge** et ses ailes noires bordés d'un jaune vif. Un **manteau brun** gagne les flancs et les côtés de la poitrine où se distingue **2 tâches pectorales**. Le reste de son corps est noir et blanc. Son **bec**, quant à lui, est de **forme conique** et de couleur beige voir rosé.

(Sources : oiseaux.net ; lpo.fr)



On le retrouve dans **toute la France** dans des **habitats variés** : boisements ouverts, landes à bruyères, bocages, lisières, jardins...

**Le saviez-vous ?**

Le chardonneret est principalement granivore et consommerait jusqu'à 150 espèces végétales différentes !




Espèce intégralement protégée (arrêté ministériel de 2009).  
Espèce inscrite à la Directive européenne oiseaux.



© pixabay.com

Le geai des chênes se reconnaît d'un coup d'œil grâce à la partie **bleu vif** à l'avant de ses ailes, contrastant avec le plumage noir et blanc de la même partie. Le reste de son corps est **majoritairement de couleur brun**, beige voir roussâtre. Au niveau de la tête, on distingue nettement des **"moustaches"** noires situées sous les yeux. Le bec est quant à lui plutôt court et noir.

(Sources : oiseaux.net ; lpo.fr)



Présent dans toute la France, le geai des chênes va privilégier les milieux forestiers lors la période de reproduction et les milieux semi ouvert le restant de l'année.

Le saviez-vous ?

Le geai des chênes fait partie de la famille des Corvidés et il est l'un des seuls à avoir un plumage coloré !




Préoccupation mineure sur le liste rouge des espèces menacées UICN.  
Espèce chassable.





La chouette hulotte se caractérise par une **grosse tête ronde** bordée d'un **disque facial** plutôt pale coupé en son centre par une ligne sombre qui rejoint le bec. L'espèce possède **deux morphotypes** de plumage (qui sont indépendants du sexe et de l'âge): une forme **rousse** et une **brune et grise**. Le bec est quant à lui surmonté d'un X de couleur blanc.

(Sources : oiseaux.net ; lpo.fr)



Présente dans une grande partie de la France et de l'Europe, la chouette hulotte va privilégier les milieux forestiers mixtes ou de feuillus assez ouverts.

Le saviez-vous ?

La chouette hulotte est très fidèle à son territoire, mais également à son partenaire. Dans une grande majorité des cas, les couples restent ensemble toute leur vie.




Espèce intégralement protégée (arrêté ministériel de 2009.)



© pixabay.com

On l'identifie par sa **tête noire** à grandes **joues blanches**. Le dessus du corps est verdâtre avec une zone plus claire sur la nuque. Les ailes et la queue sont d'un gris nettement **nuancé de bleu**. On note également la présence d'une **barre alaire blanche**. Les parties inférieures sont jaunes puis blanchissent vers la queue. (Sources : oiseaux.net ; lpo.fr)



Oiseau commun, vous pourrez observer facilement la mésange charbonnière dans les jardins et milieux forestiers, notamment dans les chênaies-hêtraies, qu'elle apprécie particulièrement.

Le saviez-vous ?

La mésange charbonnière nourrit ses petits très fréquemment, à tel point que l'on aurait déjà comptabilisé plus de 900 bécées en une seule journée !



Espèce strictement protégée (arrêté ministériel de 2009).  
Espèce inscrite à la directive oiseaux.






© pixabay.com

Le pic épeichette possède de grandes similitudes avec le pic épeiche. Cependant, on les différencie grâce à l'**absence de "bretelles" blanches** sur les ailes, ainsi que le dessous de la queue qui est blanc. Le pic épeichette est un **petit pic** qui possède un **léger dimorphisme sexuel** : le mâle possède une calotte rouge bordée de noir sur le dessus de la tête. Son ventre est blanc tandis que son dos et ses ailes sont noirs striés de blanc.

(Sources : oiseaux.net ; lpo.fr)



Présent dans la majorité du territoire Français, le pic épeichette affectionne les forêts de feuillus proches des cours d'eau pour leurs bois tendres (peupliers, saules, aulnes...).

Le saviez-vous ?

En hiver, le pic épeichette élargit très souvent son territoire pour subvenir à ses besoins. Ce dernier pouvant aller jusqu'à 500 ha.




Espèce intégralement protégée (arrêté ministériel de 2009).



© pixabay.com

Le mâle adulte apparaît globalement jaune-vert-olive avec des nuances de gris. Une partie de ses ailes et la base de sa queue possèdent une **couleur jaune vif**, facilement remarquable. Hormis les parties jaunes, la femelle est quant à elle bien plus terne que le mâle. Morphologiquement, les deux sont des oiseaux plutôt **trapus et compactes**.

(Sources : [inpn.mnhn.fr](http://inpn.mnhn.fr) ; [lpo.fr](http://lpo.fr) ; [Oiseaux.net](http://Oiseaux.net))



Présent dans toute la France, le verdier d'Europe a une préférence pour les lisières et les milieux arborés ouverts. On peut également l'apercevoir près des mangeoires dans nos jardins.

Le saviez-vous ?

Son gros bec conique lui permet de manger des graines plus dures que le tournesol telles que les grains de maïs.



Espèce intégralement protégée (arrêté ministériel du 29 octobre 2009).






© pixabay.com

La partie supérieure du grimpereau des jardins est d'un brun moucheté de clair tandis que la partie inférieure est blanchâtre. On peut reconnaître ce petit passereau par son **sourcil blanc/crème** et son **bec incurvé** vers le bas.

(Sources : [inpn.mnhn.fr](http://inpn.mnhn.fr) ; [lpo.fr](http://lpo.fr) ; [Oiseaux.net](http://Oiseaux.net))



Présent dans une grande partie de la France, le grimpereau des jardins voit sa population augmenter petit à petit. Il fréquente les boisements avec des préférences pour les vieux sujets et les ripisylves.

Le saviez-vous ?

Très arboricole, le grimpereau se confond parfaitement avec les écorces des arbres auxquels il s'accroche avec ses grands ongles acérés !



Espèce intégralement protégée (arrêté ministériel du 29 octobre 2009).

Espèce inscrite à la directive oiseau.